

Le 6 juillet 2015

AUX : Urgentologues, omnipraticiens et  
ambulanciers

## Risque de surdoses d'opiacés

### Appel à la vigilance

#### Pour communiquer avec la DSP

(numéros confidentiels, réservés aux professionnels de la santé)

- Pendant les heures ouvrables : 418 389-1520
- En dehors des heures ouvrables : 418 397-8070
- Déclaration par télécopieur : 418 389-1525

**Objet : Risque de surdoses liées à la consommation de fentanyl**

#### État de situation

Des comprimés de fentanyl contrefaits vendus comme étant de l'oxycodone ou une autre drogue circulent depuis le 2 juillet 2015 sur le territoire de la ville de Québec. La Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale a d'ailleurs émis un appel à la vigilance à cet effet. **La présence et la distribution de cette drogue dans la région de la Chaudière-Appalaches ne peuvent être exclues.**

Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec en ont détecté la présence sur le « marché noir ». Le produit en circulation est un **comprimé bleu portant l'inscription A-215 et surnommé « la petite bleue »**. Le fentanyl est un narcotique 40 fois plus puissant que l'héroïne et 50-100 fois plus puissant que la morphine. Cet opioïde est associé à des **risques élevés de surdoses et de décès**.

L'ingestion, l'injection ou l'exposition topique (peau, muqueuses) au fentanyl peut causer une dépression respiratoire et la mort. Il produit également des signes et symptômes semblables à la toxicité induite par les opioïdes en général (nausées, vomissements, constipation, état d'euphorie, prurit, hypotension, hypothermie, léthargie, convulsions, syndrome sérotoninergique [davantage en interaction médicamenteuse]), mais elle peut être plus importante.

#### Surveillance et investigation

Il apparaît probable que des consommateurs puissent se procurer ce produit en ignorant la nature de celui-ci. Des surdoses provoquées par cette drogue sont possibles. Avisez les consommateurs de drogues des risques liés au fentanyl : leur recommander de ne pas consommer seul, de réduire leur dose et de ne pas le consommer avec d'autres drogues ou de l'alcool.

Le **traitement de surdose par fentanyl** est le même que pour les autres opioïdes. Cependant, une dose supérieure à la dose maximale recommandée de naloxone (Narcan<sup>MD</sup>) pourrait être requise pour inverser les effets. Aussi, une observation accrue et prolongée des signes de rechute est recommandée. Une surveillance étroite de la respiration et la saturométrie est requise. Il est préférable de ne pas donner de supplément d'oxygène pour ne pas améliorer artificiellement la saturation, à moins que la situation clinique du patient l'exige.

Pour déclarer un cas ou demander de l'assistance à la suite d'une exposition volontaire ou involontaire à une substance potentiellement toxique, contactez le **Centre antipoison du Québec** au **1 800 463-5060** (24 heures sur 24, 7 jours sur 7).

Nous suivons la situation de près et nous vous tiendrons informés de tout développement dans ce dossier. Nous vous invitons à maintenir votre vigilance et à nous signaler tout agrégat possible de surdoses de drogues ainsi que toute situation jugée inhabituelle.

Pour déclarer un cas ou pour de l'information additionnelle, n'hésitez pas à communiquer avec le service de garde en santé et environnement selon les modalités habituelles.